

왜가리

Ardea cinerea

사철새. 몸길이는 94~107cm부리는 누런 밤색이고 눈주변은 깃이 없으며 누런 흰색이다. 몸의 윗면은 검은색을 띤 풀색이며 금속광택이 있다. 1월이 되면 정수리, 뒤통수, 목에 실모양의 흰색 장식깃이 생긴다. 허리에 삼각형의 재빛이 나는 흰색무늬가있다. 바다가, 강어구, 호수 등에서 산다. 흔하다.



누른뺨저어새

Platalea leucorodia

여름새. 몸길이는 86cm 날개길이는 40cm이다. 여름에 몸은 흰색이고 뒤통수에 짧은 땡기깃이 있고 아래목이 누런색이다. 눈안은 붉은 색이고 눈주위는 누런 흰색이다. 부리는 누런 검은색이고 다리는 검은색이다. 겨울에는 아래목에 노란테가 없고 뒤통수에 장식깃이 없다. 바다가, 호수, 논밭, 강어구의 물가에서 산다



쇠기러기

Anser albifrons

겨울새. 몸길이는 72cm 암수의 깃색이 같다. 재밤색의 배에 불규칙적인 검은색의 가로 줄무늬가 있는 것이 특징이다. 대가리와 목, 등면은 검은 밤색이다. 부리는 분홍색이고 이마는 선명한 흰색이다. 아래꼬리더부치는 흰색이다. 발은 붉은색이다. 저수지, 강, 바다가, 간석지 등의 습지와 농경지, 개활지등에서 산다.



큰기러기

Anser fabalis

검은색의 부리끝에 붉그스레한 노란색 띠가 있는 것이 특징이다. 암수의 깃색이 같다. 대가리와 목이 검붉은 밤색이며 배는 연한 재밤색이다. 등과 날개에는 검은 밤색바탕에 여러개의 가로줄이 나있다. 아래 배와 아래꼬리더부치는 흰색이다. 다리는 누런 밤색이다. 쇠기러기보다 몸집이 더 크다. 바다가와 만, 논밭, 호수와 저수지, 강, 간석지등의습지, 개활지대에서 산다.



흑고니

Cygnus olor

겨울새. 몸길이는 150cm 옷부리의 등마루가 예리하며 이마에 큰 흑돌기가 있다. 발가락사이에 막이있다. 목을 S자모양으로 유지한다. 온몸이 흰색이다. 옷부리가부와 가슴, 흑돌기, 아래부리는 검은 밤색이다.부리의 나머지 부분은 누런 분홍색이다. 큰 호수, 강어구, 큰 늪에서 산다.



큰고니

Cygnus cygnus

겨울새. 몸길이는 158~164cm



재두루미

Grus vipio

겨울새. 몸길이는 101~119cm 이마, 대가리 옆은 드러났고 붉은색이며 강모는 검은색이다. 정수리에서 뒤목까지, 턱밑에서 목까지는 흰색이다. 비깃은 연한 재색이고 큰 비깃의 끝은 재빛 흰색이다. 꼬리는 어두운 재색이고 다리는 분홍색이다. 호수주변, 강변, 해안지대의 논 밭, 벌판지대의 들판에서 산다.



흰목검은두루미 (갯두루미)

Grus monacha

겨울새. 몸길이는 76cm 이마에 검은색의 강모가 있고 정수리의 앞부분은 드러났다. 대가리, 목은 흰색이고 정수리 앞부분은 붉은색이다. 부리는 누런푸른색이고 밑부분은 어두운 붉은색이며 다리는 연한 검은색이다.



검은댕기흰죽지오리

Aythya fuligula

검은색 댕기와 노란색의 눈이 특징이다. 부리는 재색이며 끝에 검은점이 있다. 수컷: 선명한 흰 색의 옆구리와 배, 날개의 일부를 제외한 온 몸이 검은색이다. 야외에서 검은색으로 보이는 보라색 광택의 대가리에는 긴 댕기가 있다. 암컷: 옆구리는 어두운 밤색이며 대가리에는 보라색광택이 없으며 댕기가 짧다. 호수, 저수지, 하천, 강어구 등에서 산다. 흔하다.



바다평

Clangula hyemalis

겨울새. 몸길이: 48~51cm
수컷의 대가리, 목은 흰색이며 뺨은 재색이고 옆목은 붉은밤색이며 가슴은 검은밤색이다. 등, 배, 아래꼬리더부치는 회색이며 날개는 검은색이다. 부리는 검은색이며 끝에 붉은반점이 있다. 겨울에는 대가리와 목이 검은 밤색이며 등에 누런밤색의 고리무늬가 있다. 암컷의 정수리, 뒤통수, 뺨 등은 검은밤색이며 아래목과 가슴은 누런 검은색이다. 바다가와 먼 바다에서 산다.

알송오리

Anas penelope

겨울새. 몸길이: 49cm
정수리선이 누런 밤색을 띠는 것이 특징이다. 수컷의 대가리는 붉은밤색이며 가슴은 분홍색을 띤 밤색이다. 아래꼬리더부치는 검은색이다. 선명한 흰색날개비깃은 앉아있을 때 흰 가로줄로 보이며 바깥쪽의 경우에도 변하지 않는다. 암컷: 다 오리류의 암컷에 비해 붉은 색채를 띤다. 날개비깃은 재색이다. 간석지, 호수, 바다가에서 산다.



흰꼬리수리

Haliaeetus albicilla

사철새. 몸길이: 80~94cm
암수의 깃색이 같다. 꼬리깃이 희다. 대가리꼭대기, 목, 뒤통수의 깃은 버들잎모양이며 밑등은 연한 흰색, 깃족과 깃판은 연한 밤색이다. 등면은 보라색이 나는 연한 밤색인데 어깨깃은 좀 진하다. 턱 아래와 앞목은 뒤통수의 색과 같고 가슴 아래의 배면은 등면과 비슷하나 좀더 연하다. 부리와 발가락은 연한 누런색이다. 해안과 습지, 호수, 강하천 주변에서 산다.

붉은꼭두오리

Anas falcata

겨울새. 몸길이: 48cm
수컷의 이마, 정수리선, 뺨선이 검은 밤색으로 연결되고 눈썹부분이 푸른색을 띤다. 턱과 옆목, 앞목은 흰색이며 목걸이모양의 검은띠가 있다. 가슴, 어깨, 옆구리에는 검은색과 흰색의 반달모양무늬가 있다. 배와 꼬리는 누런 흰색이며 꼬리 끝부분에는 넓은 검은띠가 있다. 암컷은 누런밤색이며 등에 검은밤색의 줄무늬가 있다. 강하천과 호수, 습지, 풀숲지대에서 산다.



원앙

Aix galericulata

여름새. 몸길이: 43cm
수컷의 대가리 꼭대기는 검푸른색이고 뒤통수는 붉은 푸른색이다. 눈썹은 흰색이며 뺨과 앞목은 검은색이고 흰무늬가 있다. 가슴은 붉은색이고 등과 날개는 검푸른색이다. 암컷은 검은밤색이며 눈썹과 턱 밑, 배는 흰색이다. 부리는 검은 밤색이고 다리는 붉은 밤색이다. 산을 낀 강하천과 호수, 늪에서 산다.

붉은어깨갯도요 (칼리드리도요)

Calidris tenuirostris

여름새. 몸길이: 26cm
여름깃과 겨울깃의 색이 다르다. 여름에는 등면이 밤색이며 두줄의 검은밤색의 등근무늬가 있다. 1월 날깃은 검은색이다. 배쪽은 흰색이며 옆구리에 검은점무늬가 드물게 있다. 부리는 검은색이고 다리는 검푸른색이다. 겨울에는 등에 밤색의 무늬가 없어지고 흰꼬리줄무늬가 생긴다. 바다가의 습지, 강기슭에서 산다.



알락꼬리마도요

Numenius madagascariensis

여름새. 몸길이: 61cm
암수의 깃색이 같다. 몸은 누런밤색이다. 눈썹선, 턱은 누런흰색이고 대가리, 목, 가슴, 배에는 검은밤색의 세로무늬가 있고 등과 날개에는 검은밤색의 모난 줄무늬가 있다. 1월 날깃, 부리의 끝 절반은 검은색이고 밑부리 절반은 분홍색이다. 다리는 푸른하늘색이다. 해안지대, 간석지, 강어구의 습지, 섬, 소금밭, 논밭에서 산다.

큰물닭 (물닭)

Fulica atra

겨울새. 몸길이: 40cm
암수의 깃색이 같다. 온몸이 검고 통통하다. 흰색의 부리와 이마판이 뚜렷하며 날때는 2월날깃의 흰색 끝부분이 보인다. 다리는 검은색이며 발가락 사이막을 가지고있어 수면을 헤엄치는데 알맞춤하며 잠수도 잘한다. 강, 호수, 저수지 등의 내륙 습지에서 산다. 비교적 많다.



까치도요 (검은머리물떼새)

Haematopus ostralegus

여름새. 몸길이: 45cm정도
암수의 깃색이 같으나 여름깃과 겨울깃이 다르다. 겨울에는 대가리, 목, 가슴, 등, 꼬리가 검은색이다. 날개에 넓은 흰띠가 있다. 부리는 누런붉은색이고 다리는 연한 붉은색이다. 여름에는 윗목의 앞부분에 목도리모양의 흰색무늬가 생긴다. 해안지대의 섬, 강어구, 습지에서 산다.